

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -2^η 2023 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Σημείωση: οι ορθές απαντήσεις εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά)

1. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις συνοδεύεται συχνά από πυρετό:
A Πνευμονία
B Υπερνέφρωμα
Γ Έξαρση ελκώδους κολίτιδας
Δ Λέμφωμα
E Όλα τα παραπάνω

2. Στα αυτοάνοσα νοσήματα δεν περιλαμβάνεται:
A Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
B Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
Γ Συστηματικός ερυθματώδης λύκος
Δ Πολυκυστική νόσος των νεφρών
E Ρευματοειδής αρθρίτιδα

3. Στη σταδιοποίηση του λεμφώματος σε ένα άρρωστο σημειώθηκε μονήρης υπερκλείδια λεμφαδενοπάθεια με προσβολή του μεσοθωρακίου. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νόσος;
A Στάδιο I
B Στάδιο II
Γ Στάδιο III
Δ Στάδιο IV
E Για τη σταδιοποίηση χρειάζεται μυελόγραμμα

4. Ποια εξέταση έχει τη μεγαλύτερη διαγνωστική αξία για τον καρκίνο του στομάχου;
A Αξονική Τομογραφία
B Γαστροσκόπηση με βιοψία
Γ Ακτινογραφία στομάχου δωδεκαδακτύλου (διπλής αντίθεσης)
Δ Κυτταρολογική εξέταση γαστρικού υγρού
E Ανίχνευση του καρκινικού δείκτη CEA στον ορό του ασθενούς

5. Πού οφείλεται η αιφνίδια εμφάνιση εγκεφαλοπάθειας σε έναν κίρρωτικό που ήταν για μακρύ χρονικό διάστημα σε σταθερή κατάσταση;
A Σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές
B Σε λοίμωξη
Γ Σε αιμορραγία του πεπτικού
Δ Σε ανάπτυξη ηπατώματος
E Σε όλα τα παραπάνω

6. Η δοκιμασία καταστολής με 1mg δεξαμεθαζόνης χρησιμοποιείται για τη διάγνωση:
A Του συνδρόμου Cushing
B Της χρόνιας επινεφριδικής ανεπάρκειας
Γ Του άποιου διαβήτη
Δ Του πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού
E Του υπερπαραθυρεοειδισμού

7. Στις παρακάτω καταστάσεις χρησιμοποιούνται οι β-αναστολείς εκτός από
A Διαλείπουσα χωλότητα
B Σταθερή στηθάγχη
Γ Αρτηριακή υπέρταση
Δ Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία
E Υπερθυρεοειδισμός
8. Ποια ηπατίτιδα μεταδίδεται συχνότερα με την σεξουαλική επαφή;
A Ηπατίτιδα A
B Ηπατίτιδα B
Γ Ηπατίτιδα C
Δ Ηπατίτιδα D
E Ηπατίτιδα E
9. Εκδηλώσεις της αυτόνομης νευροπάθειας σε σακχαροδιαβητικούς ασθενείς είναι όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα
A Γαστροπάρεση
B Υπεριδρωσία των κάτω άκρων
Γ Σεξουαλική δυσλειτουργία
Δ Ορθοστατική υπόταση
E Νωθρότητα αντίδρασης της κόρης του οφθαλμού στο φώς
10. Το νεφρωσικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα
A Δυσλιποπρωτεϊναιμία
B Υπολευκωματιναιμία
Γ Υπολιπιδαιμία
Δ Προδιάθεση για λοιμώξεις
E Προδιάθεση για θρομβώσεις
11. Υπερουριχαιμία απαντά σε:
A Μυελο-υπερπλαστικές νόσους
B Λήψη θειαζιδών
Γ Λήψη αλκοόλ
Δ Όλα τα παραπάνω
E Το A και Γ
12. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα δεν προκαλεί ηπατοκυτταρική βλάβη;
A Ριφαμπικίνη
B Γενταμικίνη
Γ Ισονιαζίδη
Δ Παρακεταμόλη
E Τετρακυκλίνη
13. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στην κροταφική ή γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα:
A Προσβάλλει κυρίως τους ηλικιωμένους
B Χαρακτηρίζεται από αναιμία χρόνιας νόσου και αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών
Γ Μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση
Δ Όλα τα παραπάνω
E Το A και B

14. Σε ποια βαλβιδική καρδιακή βλάβη υπάρχει πρωτοδιαστολικό φύσημα:
- A Ανεπάρκεια αορτής**
 - B Στένωση αορτής
 - Γ Ανεπάρκεια μιτροειδούς
 - Δ Ανεπάρκεια τριγλώχινας
 - E Στένωση μιτροειδούς
15. Η θεραπεία με κυκλοσπορίνη δυνατό να προκαλέσει όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα:
- A Υπερουρικαιμία
 - B Υπερτρίχωση
 - Γ Υπερπλασία των ούλων
 - Δ Πνευμονική ίνωση**
 - E Διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας
16. Μετά την έκθεση σε ποιον από τους παρακάτω λοιμογόνους παράγοντες απαιτείται προληπτική αγωγή:
- A Ιό HIV
 - B Σταφυλόκκοκο
 - Γ Ιό ηπατίτιδας Β
 - Δ Το Α και Γ**
 - E Όλα τα παραπάνω
17. Κύρια παρενέργεια των στατινών είναι η αύξηση:
- A Της ουρίας
 - B Της CPK**
 - Γ Του ουρικού οξέος
 - Δ Της LDH
 - E Της αλκαλικής φωσφατάσης
18. Το αιμολυτικό – ουραιμικό σύνδρομο αποτελεί πιθανό αίτιο θρομβοπενίας, λόγω:
- A Μειωμένης παραγωγής αιμοπεταλίων από το μυελό
 - B Αυτοάνοσου μηχανισμού
 - Γ Αλλοαντισωμάτων
 - Δ Κατανάλωσης αιμοπεταλίων**
 - E Ποιοτικών διαταραχών των αιμοπεταλίων
19. Η εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση των διαταραχών της κινητικότητας του οισοφάγου είναι
- A Η οισοφαγο-γαστροσκόπηση
 - B Το οισοφαγογράφημα με βάριο
 - Γ Η μανομετρία οισοφάγου**
 - Δ Η 24ωρη φορητή pHμετρία
 - E Ο ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος
20. Στα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα της οξείας φάσης του διατοίχωματικού εμφράγματος του μυοκαρδίου περιλαμβάνονται:
- A Ανάσπαση του ST διαστήματος**
 - B Κύματα Q
 - Γ Βαθιά κύματα S
 - Δ Πτώση του PR διαστήματος
 - E Κύματα QS

21. Η εμπειρική θεραπεία της μικροβιακής μηνιγγίτιδας σε ενήλικες συνίσταται σε χορήγηση:
- A Κεφτριαζόνης**
 - B Γενταμικίνης και πενικιλίνης G
 - Γ Σιπροφλοξασίνης
 - Δ Αζτρεονάμης
 - E Κεφοξιτίνης
22. Ως σημαντική μικροβιουρία χαρακτηρίζεται
- A Η ανεύρεση στην καλλιέργεια ούρων τουλάχιστον 100.000 C.F.U. /ml ούρων**
 - B Η μικροβιουρία που συνδυάζεται με δυσουρικά ενοχλήματα
 - Γ Η ανεύρεση στην καλλιέργεια ούρων τουλάχιστον 10.000 C.F.U. /ml ούρων
 - Δ Η ανεύρεση στην καλλιέργεια ούρων τουλάχιστον 1000 C.F.U. /ml ούρων
 - E Η ανεύρεση μικροσκοπικής βακτηριουρίας και πτυοουρίας
23. Σημειώστε ποια από τις παρακάτω παθήσεις απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση:
- A Ινομυαλγία
 - B Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 - Γ Σηπτική αρθρίτιδα**
 - Δ Οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 - E Οστεοπόρωση από κορτικοειδή
24. Τι δεν χαρακτηρίζει την σιδηροπενική αναιμία;
- A Μικροκυττάρωση
 - B Χαμηλά επίπεδα φυλικού οξέος**
 - Γ Ελαττωμένος σίδηρος ορού
 - Δ Αυξημένη ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)
 - E Ελαττωμένη φερριτίνη ορού
25. Τα παρακάτω αποτελούν ενδείξεις χορήγησης ακυκλοβίρης εκτός από ένα
- A Ιογενής εγκεφαλίτιδα
 - B Απλούς έρπητος
 - Γ Ανεμευλογία
 - Δ Προφύλαξη από κυτταρομεγαλοϊό σε μεταμοσχευμένους ασθενείς
 - E Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης**
26. Οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στην δεξιά έσω κάψα προκαλεί
- A Ομόπλευρη ημιπληγία
 - B Αντίπλευρη ημιπληγία**
 - Γ Ομώνυμη ημιανοψία
 - Δ Ετερόνυμη ημιανοψία
 - E Παραπληγία
27. Όλα τα παρακάτω μικρόβια ενοχοποιούνται ως αίτια οξείας λοίμωξης των χοληφόρων, εκτός από:
- A Εντεροβακτηριοειδή
 - B Μυκόπλασμα**
 - Γ Αναερόβια
 - Δ Εντερόκοκκος
 - E Βακτηροειδή

28. Σπληνομεγαλία συνήθως παρατηρείται σε όλα εκτός από ένα:
- A Πολλαπλούν μυέλωμα**
 - B Μυελοϊνώση
 - Γ Μεσογειακή αναιμία
 - Δ Χρόνια λεμφογενής λευχαιμία
 - E Σύνδρομο Felty
29. Τι από τα παρακάτω θα προτείνετε σε ασθενή 30 ετών με δυσπεψία, οπισθοστερνικό καύσο και απώλεια βάρους 5 κιλών τους 4 τελευταίους μήνες:
- A Δοκιμαστική θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων
 - B Γαστροσκόπηση**
 - Γ Έλεγχο ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με αναπνευστική δοκιμασία
 - Δ Αιματολογικές εξετάσεις
 - E Αξονική τομογραφία κοιλίας
30. Ένας ασθενής πάσχει από ασταθή στηθάγχη. Στη στεφανιογραφία βρίσκεται νόσος του στελέχους. Η καλύτερη θεραπεία για το ασθενή αυτόν είναι:
- A Αορτοστεφανιαία παράκαμψη**
 - B Απλή αγγειοπλαστική με μπαλόνι
 - Γ Αγγειοπλαστική με τοποθέτηση στεφανιαίας ενδοπρόσθεσης (stent)
 - Δ β-αναστολείς
 - E Αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου
31. Φάρμακα που δεν χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των ιογενών λοιμώξεων είναι:
- A Γκανκικλοβίρη
 - B Ακυκλοβίρη
 - Γ Βαλακυκλοβίρη
 - Δ Αμφοτερικίνη**
 - E Ζιντοβουδίνη
32. Αιμόπτυση ενδέχεται να παρατηρηθεί σε όλα τα παρακάτω νοσήματα, εκτός από ένα
- A Πνευμονική εμβολή
 - B Βρογχεκτασίες
 - Γ Πνευμονική ίνωση**
 - Δ Βρογχογενές καρκίνωμα
 - E Χρόνια βρογχίτιδα
33. Ποιος είναι ο συχνότερος μικροοργανισμός που προκαλεί λοίμωξη μετά από δάγκωμα σκύλου;
- A Pasteurella multocida**
 - B Neisseria meningitides
 - Γ Streptococcus pneumoniae
 - Δ Klebsiella
 - E Pseudomonas

34. Στην πνευμονική πύκνωση:
- A Υπάρχει σαφής πνευμονικός ήχος επικρουστικά
 - B Οι φωνητικές δονήσεις είναι αυξημένες**
 - Γ Οι φωνητικές δονήσεις είναι ελαττωμένες
 - Δ Υπάρχουν ξηροί μουσικοί ρόγχοι
 - E Υπάρχει πλευριτική τριβή
35. Ποιο από τα παρακάτω προκαλεί μυοπάθεια
- A Δερματομυοσίτιδα
 - B Κατάχρηση ηρωίνης
 - Γ Υποκαλιαιμία
 - Δ Το A και B
 - E Όλα τα παραπάνω**
36. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασμένο σχετικά με τη νόσο Wilson
- A Κληρονομείται με το φυλοσύνδετο χαρακτήρα**
 - B Οφείλεται σε διαταραχή της σύνθεσης της σερουλοπλασμίνης
 - Γ Οι ασθενείς εμφανίζουν αιμολυτικές κρίσεις, λευκοπενία και θρομβοπενία
 - Δ Φέρεται και ως ηπατοφακοειδής εκφύλιση
 - E Η έγκαιρη θεραπεία με D-πενικιλλαμίνη βελτιώνει την πρόγνωση
37. Ποια από τις παρακάτω είναι προτιμότερη αντιμετώπιση της οξείας κίρσορραγίας;
- A Η χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων
 - B Η μεταμόσχευση ήπατος
 - Γ Η αγγειογραφία
 - Δ Η ενδοσκοπική αιμόσταση**
 - E Η χορήγηση β-blockers
38. Πολύ αυξημένες τιμές ταχύτητας καθιζήσεως ερυθρών (ΤΚΕ ανευρίσκονται σε:
- A Πολλαπλό Μυέλωμα
 - B Κροταφική αρτηρίτιδα
 - Γ Πνευμονική εμβολή
 - Δ Το A και B**
 - E Όλα τα παραπάνω
39. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις δυνατό να σχετίζεται με υπερχοληστεριναιμία;
- A Υποθυρεοειδισμός
 - B Νεφρωσικό σύνδρομο
 - Γ Λήψη αναβολικών στεροειδών
 - Δ Το A και B
 - E Όλα τα παραπάνω**
40. Η σιδηροπενική αναιμία χαρακτηρίζεται από:
- A Μικροκυττάρωση**
 - B Αυξημένα επίπεδα φερριτίνης πλάσματος
 - Γ Νορμοχρωμία
 - Δ Φυσιολογικό σίδηρο στο μυελό των οστών
 - E Αυξημένα επίπεδα φυλλικού οξέος πλάσματος

41. Στη θεραπεία του αναφυλακτικού shock φάρμακο πρώτης επιλογής είναι:
- A Η κορτιζόνη
 - B Αντι-ισταμινικό παρεντερικά
 - Γ Αντι-ισταμινικό από το στόμα
 - Δ Η αδρεναλίνη**
 - E Επιλεκτικός β2-αδρενεργικός αγωνιστής (albuterol)
42. Ο συνήθης μηχανισμός με τον οποίο ο υπερθυρεοειδισμός προκαλεί διάρροια είναι:
- A Δυσασπορρόφηση βιταμίνης B12
 - B Υπερπαραγωγή VIP
 - Γ Φλεγμονή του παχέος εντέρου
 - Δ Αυξημένη κινητικότητα του λεπτού εντέρου**
 - E Αυξημένη έκκριση του λεπτού εντέρου
43. Η συνηθέστερη ανεπιθύμητη ενέργεια των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου είναι
- A Ξηρός βήχας**
 - B Ξηροστομία
 - Γ Ερυθρότητα προσώπου
 - Δ Οιδήματα στα άκρα
 - E Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου βαθμού
44. Στην ανεπάρκεια της μιτροειδούς όλα είναι σωστά εκτός από ένα:
- A Τόσο ο αριστερός κόλπος όσο και η αριστερή κοιλία δεν μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους, ενώ αυξάνεται μόνο η τελοδιαστολική πίεση τους**
 - B Η συνυπάρχουσα στένωση της αορτής συνεπάγεται αύξηση του βαθμού της ανεπάρκειας της μιτροειδούς
 - Γ Η διάταση του μιτροειδικού δακτυλίου αποτελεί σημαντική αιτία ανεπάρκειας της μιτροειδούς
 - Δ Συχνή επιπλοκή της νόσου είναι η εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής
 - E Ο καρδιοθωρακικός δείκτης είναι αυξημένος στη χρόνια ανεπάρκεια της μιτροειδούς
45. Στις επιπλοκές της παχυσαρκίας ανήκουν τα ακόλουθα εκτός από:
- A Οστεοπόρωση**
 - B Άπνοια κατά τον ύπνο
 - Γ Χολολιθίαση
 - Δ Νεοπλάσματα
 - E Οστεοαρθρίτιδα κάτω άκρων
46. Ποιο από τα παρακάτω νοσήματα δεν προκαλεί υπονατριαιμία;
- A Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης
 - B Άποιος διαβήτης**
 - Γ Κίρρωση του ήπατος
 - Δ Νόσος του Addison
 - E Γαστρεντερίτιδα
47. Συχνό αίτιο υπερκαλιαιμίας είναι:
- A Η χρήση ανταγωνιστών ασβεστίου
 - B Η μεταβολική αλκάλωση
 - Γ Η μεταβολική οξέωση**
 - Δ Το σύνδρομο Cushing
 - E Ο άποιος διαβήτης

48. Το σύνδρομο Löffgren στη σαρκοείδωση περιλαμβάνει:
- A Αμφοτερόπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια
 - B Οζώδες ερύθημα
 - Γ Αρθρίτιδα
 - Δ Τα Α, Β και Γ**
 - E Κανένα από τα παραπάνω
49. Ασθενής 75 ετών με κολπική μαρμαρυγή προσέρχεται επειγόντως με πτώση γωνίας στόματος αριστερά, αριστερή ημιπάρεση και διαταραχές της αισθητικότητας αριστερά. Ποια από τις παρακάτω εγκεφαλικές αρτηρίες είναι πιθανότερα προσβεβλημένη;
- A Δεξιά μέση εγκεφαλική**
 - B Δεξιά πρόσθια εγκεφαλική
 - Γ Αριστερή πρόσθια εγκεφαλική
 - Δ Αριστερή μέση εγκεφαλική
 - E Το Γ και Δ
50. Ποιο από τα παρακάτω σύνδρομα χαρακτηρίζεται από αρθρίτιδα και ουρηθρίτιδα και παρατηρείται συχνότερα σε άνδρες;
- A Mallory-Weiss
 - B Καρκινοειδές
 - Γ Reiter**
 - Δ Sjoegren
 - E Ehlers-Danlos
51. Η μικρολευκωματινουρία αποτελεί δείκτη:
- A Αρχόμενης βλάβης του νεφρικού σπειράματος**
 - B Υπερλευκωματιναιμίας
 - Γ Ανεπαρκούς ρύθμισης του ΣΔ
 - Δ Ουρολοίμωξης
 - E Τίποτα από τα παραπάνω
52. Ποιο από τα παρακάτω προκαλεί διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ, DIC):
- A Βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 - B Σηψαιμία
 - Γ Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
 - Δ Το Β και Γ
 - E Το Α και Β**
53. Οξύ κοιλιακό άλγος παρατηρείται τυπικά σε όλα τα παρακάτω εκτός από ένα:
- A Αιμορραγία δωδεκαδακτυλικού έλκους**
 - B Ανιούσα χολαγγειίτιδα
 - Γ Οξεία παγκρεατίτιδα
 - Δ Ρήξη ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής
 - E Εμβολή μεσεντερίου αρτηρίας
54. Ασθενής με συστηματικό ερυθματώδη λύκο μπορεί να έχει όλα τα παρακάτω, εκτός από ένα:
- A Διαβρωτική αρθρίτιδα άκρων χεριών**
 - B Έλκη στόματος
 - Γ Φωτοευαίσθητο εξάνθημα προσώπου
 - Δ Λευκοπενία
 - E Θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα

55. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα χορηγείται συνήθως σε ασθενή με οξεία μυελογενή λευχαιμία, ουδετεροπενία και πυρετό (39,5ο C):
- A Αμφοτερικίνη Β
 - B Ευρέως φάσματος αντιβίωση
 - Γ Γαγκκυκλοβίρη
 - Δ Το Α και Β**
 - E Το Β και Γ
56. Κυριότερο αίτιο μικροζώδους κίρρωσεως είναι:
- A Η χρόνια ηπατίτιδα C
 - B Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση
 - Γ Η αλκοολική νόσος του ήπατος**
 - Δ Η αιμοχρωμάτωση
 - E Τα κοκκιωματώδη νοσήματα του ήπατος
57. Στις πρώιμες επιπλοκές της παγκρεατίτιδας υπάγονται τα παρακάτω εκτός από μία
- A Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 - B Παγκρεατική αιμορραγία
 - Γ Υπασβεστιαμία
 - Δ Υπογλυκαιμία
 - E Αιμολυτική αναιμία**
58. Η υπονατριαιμία είναι σύνηθες εργαστηριακό εύρημα σε:
- A Πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό
 - B Απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης**
 - Γ Σύνδρομο Cushing
 - Δ Άποιο διαβήτη
 - E Εξωγενή χορήγηση γλυκοκορτικοειδών
59. Το τοξικό αδένωμα θυρεοειδούς χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω εκτός από ένα:
- A Υπερλειτουργία μονήρους όζου
 - B Συμπεριφέρεται ως αυτόνομο χωρίς να προκαλεί θυρεοτοξίκωση
 - Γ Αυξημένη TSH**
 - Δ Απεικονιστικά εμφανίζεται ως μονήρης θερμός όζος
 - E Η χειρουργική επέμβαση γίνεται όταν ο ασθενής καταστεί ευθυρεοειδικός
60. Ποιο από τα παρακάτω δεν χαρακτηρίζει τη νεφραγγειακή υπέρταση:
- A Φύσημα στο επιγάστριο
 - B Χαμηλός αιματοκρίτης**
 - Γ Υψηλή αλδοστερόνη ορού
 - Δ Υψηλή ρενίνη ορού
 - E Εμφάνιση σε ηλικία <20 ετών
61. Το σύνδρομο του καρωτιδικού κόλπου
- A Εκδηλώνεται με περιστροφική ζάλη
 - B Είναι αθώα διαταραχή που αντιμετωπίζεται συμπτωματικά
 - Γ Οφείλεται συνήθως σε αθηρωματική βλάβη των τασεοϋποδοχέων των καρωτίδων**
 - Δ Αντιμετωπίζεται με αντιαρρυθμικά φάρμακα
 - E Όλα τα παραπάνω

62. Ποιο ή ποια μικρόβια είναι πιθανότερο να προκαλέσουν μηνιγγίτιδα σε άτομο 18-20 ετών;
- A Σταφυλόκοκκος
 - B Gram αρνητικά
 - Γ Πνευμονιόκοκκος**
 - Δ Τίποτα απ' τα παραπάνω
 - E Όλα τα παραπάνω
63. Ποιο από τα ακόλουθα δεν εκδηλώνεται με νεφρωσικό σύνδρομο
- A Μεσαγγειακή IgA νεφροπάθεια
 - B Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα
 - Γ Νόσος Hodgkin
 - Δ Αμυλοείδωση
 - E Νεφροπάθεια από αναλγητικά**
64. Υψηλή αρτηριακή πίεση και ανεύρεση ερυθροκυτταρικών (αιμορραγικών) κυλίνδρων και λευκώματος στα ούρα χαρακτηρίζουν κυρίως:
- A Τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 - B Το νεφρωσικό σύνδρομο
 - Γ Τη διάμεση νεφρίτιδα
 - Δ Την αποφρακτική ουροπάθεια
 - E Το νεφριτικό σύνδρομο**
65. Υποξία-υποκαπνία στα αέρια αίματος δεν παρατηρείται σε:
- A Πνευμονική εμβολή
 - B Οξύ πνευμονική οίδημα
 - Γ Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
 - Δ Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια**
 - E Πνευμονία από πνευμονιόκοκο
66. Στις παρενέργειες της μεθοτρεξάτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας περιλαμβάνονται όλα εκτός από:
- A Θρομβοκυττάρωση**
 - B Λευκοπενία
 - Γ Αύξηση αλκαλικής φωσφατάσης ορού
 - Δ Τριχόπτωση
 - E Οξεία πνευμονίτιδα
67. Η κρουσφαιριναιμία τύπου II σχετίζεται με
- A Ηπατίτιδα C
 - B Παρουσία ρευματοειδούς παράγοντα στον ορό
 - Γ Πορφύρα
 - Δ Όλα τα παραπάνω**
 - E Το B και Γ
68. Τι από τα παρακάτω δεν ενδείκνυται ως θεραπεία του οξέως στεφανιαίου συνδρόμου
- A Μορφίνη
 - B Υπογλώσσια νιτρογλυκερίνη
 - Γ Ασπιρίνη
 - Δ Αδρεναλίνη**
 - E Οξυγόνο

69. Ποιο από τα παρακάτω είναι κοινό χαρακτηριστικό της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας, της πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας και της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας με προσβολή της μιτροειδούς.
- A Μειωμένος όγκος παλμού
 - B Μειωμένη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου
 - Γ Κίνδυνος συστηματικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων**
 - Δ Η στένωση της μιτροειδούς
 - E Η λοιμώδης αιτιολογία
70. Γυναίκα ηλικίας 65 ετών, παχύσαρκη, προσέρχεται στο γιατρό λόγω αρρυθμίας. Η ασθενής λαμβάνει από ετών 75 μg θυροξίνης ημερησίως λόγω πολυοζώδους βρογχοκήλης. Στο ΗΚΓ διαπιστώνεται κολπική μαρμαρυγή. Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση.
- A Η τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη**
 - B Η λήψη αυτοβούλως θυρεοειδικών ορμονών με στόχο την απώλεια βάρους
 - Γ Το αυτόνομο λειτουργικό αδένωμα θυρεοειδούς
 - Δ Η νόσος του Grave**
 - E Εστιακή θυρεοειδίτιδα
71. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τη συμπιεστική περικαρδίτιδα:
- A Υπάρχει διόγκωση των φλεβών του τραχήλου**
 - B Στο ΗΚΓ τα δυναμικά είναι υψηλά
 - Γ Συνοδεύεται πολύ συχνά από κοιλιακή μαρμαρυγή
 - Δ Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται κατά την εισπνοή
 - E Η καρδιαγγειακή σκιά έχει μικρό μέγεθος στην ακτινογραφία θώρακος
72. Σε ασθενή με λοιμώδη μονοπυρήνωση είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος, όταν χορηγηθεί ένα από τα παρακάτω αντιβιοτικά:
- A Αμινογλυκοσίδη
 - B Τετρακυκλίνη
 - Γ Χλωραμφενικόλη
 - Δ Αμπικιλλίνη**
 - E Βανκομυκίνη
73. Στην ελονοσία δυνατό να χορηγούνται όλα τα παρακάτω φάρμακα εκτός από ένα:
- A Κινίνη
 - B Μεφλοκίνη
 - Γ Δεξαμεθαζόνη**
 - Δ Πριμακίνη
 - E Χλωροκίνη
74. Ασθενής με χρόνια βρογχίτιδα και με PO₂: 60 mmHg, pCO₂: 70 mmHg, pH: 7.28, έχει:
- A Αναπνευστική οξέωση**
 - B Αναπνευστική αλκάλωση
 - Γ Άμεση ανάγκη οξυγόνου
 - Δ Το A και Γ
 - E Κανένα από τα παραπάνω
75. Κατάσταση ή καταστάσεις που υποδύονται οξεία κοιλία είναι:
- A Πορφύρα Henoch-Schonlein**
 - B Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση
 - Γ Οξεία πλευρίτιδα
 - Δ Γαστρικό έλκος
 - E Γαστρορραγία

76. Ποιο από τα παρακάτω που αφορούν στο φαιοχρωμοκύττωμα είναι λάθος
 Α Συνήθης εντόπιση είναι ο μυελός των επινεφριδίων
Β Συνήθης εντόπιση είναι ο φλοιός των επινεφριδίων
 Γ Οι περισσότεροι όγκοι είναι ενδοκοιλιακοί
 Δ Συχνή είναι η εντόπιση κατά μήκος της συμπαθητικής αλύσου
 Ε Χαρακτηριστική η απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης
77. Στον καρδιακό επιπωματισμό παρατηρούνται όλα τα παρακάτω εκτός από ένα
Α Βραδυκαρδία
 Β Πτώση της συστολική αρτηριακής πίεσης
 Γ Παράδοξος σφυγμός
 Δ Διάταση σφαγιτίδων
 Ε Ηπατομεγαλία
78. Ένας εξηνταπεντάχρονος ασθενής παρουσιάζει χρόνια κολπική μαρμαρυγή, σε έδαφος στένωσης της μιτροειδούς, με μέση συχνότητα κοιλιακής ανταπόκρισης 65 σφύξεις/λεπτό. Ποιο είναι το κύριο φάρμακο, πρώτης επιλογής σας, από τα παρακάτω
 Α Β-αναστολέας
 Β Διλτιαζέμη
 Γ Δακτυλίτιδα (Digoxin)
Δ Κουμαρινικά αντιπηκτικά
 Ε Ασπιρίνη
79. Τι ισχύει για την οστεομελίτιδα
 Α Μπορεί να υποτροπιάσει
 Β Οι σταφυλόκοκκοι αποτελούν συχνό αίτιο
 Γ Δεν γίνεται αντιληπτή στα αρχικά στάδια στην απλή ακτινογραφία
 Δ Απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία
Ε Όλα είναι σωστά
80. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στις νεφρικές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη
 Α Οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά από χορήγηση ακτινοσκοπικών φαρμάκων
 Β Θηλική νέκρωση
 Γ Υπορενιναιμικός υποαλδοστερονισμός
Δ Σπειραματοπάθεια ελαχίστων αλλοιώσεων με νεφρωσικό σύνδρομο
 Ε Το νεφρωσικό σύνδρομο
81. Σε ποιον τύπο καρκίνου του πνεύμονα είναι συχνότερη η παρουσία εγκεφαλικών μεταστάσεων;
 Α Αδενοκαρκίνωμα
 Β Πλακώδες
Γ Μικροκυτταρικό
 Δ Καρκινοειδές
 Ε Μεγαλοκυτταρικό
82. Στο σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet μπορεί να υπάρχουν
 Α Άφθες στόματος επώδυνες
 Β Έλκη γεννητικών οργάνων
 Γ Οζώδες ερύθημα
Δ Όλα τα παραπάνω
 Ε Το Α και Β

83. Για τη διάγνωση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου τα αντιπυρηνικά αντισώματα έχουν
- A Μεγάλη ευαισθησία και μεγάλη ειδικότητα
 - B Μεγάλη ευαισθησία αλλά μικρή ειδικότητα**
 - Γ Μικρή ευαισθησία και μικρή ειδικότητα
 - Δ Μικρή ευαισθησία αλλά μεγάλη ειδικότητα
 - E Τίποτα από τα παραπάνω
84. Ποιο από τα παρακάτω είναι το σημαντικότερο πρώτο βήμα στην θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης;
- A Η αποκατάσταση των επιπέδων του καλίου
 - B Η έναρξη αντιβιοτικής θεραπείας
 - Γ Η αποκατάσταση των επιπέδων του φωσφόρου
 - Δ Η χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως**
 - E Η διόρθωση του ελλείματος μαγνησίου
85. Μία καπνίστρια, αλκοολική και υπέρτασική 54 ετών προσκομίζεται με αιφνίδια εγκατάσταση αριστεράς ημιπληγίας. Ακούγεται φύσημα στη δεξιά καρωτίδα. Ποιο από τα παρακάτω είναι η πλέον κατάλληλη αρχική παρακλινική δοκιμασία;
- A ΗΕΓ
 - B Υπερηχογράφημα καρωτίδων
 - Γ Αγγειογραφία καρωτίδας
 - Δ Υπερηχογράφημα καρδιάς
 - E Αξονική εγκεφάλου**
86. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στη σαρκοείδωση;
- A Προκαλεί υπερασβεστιαιμία
 - B Η διάγνωση δυνατό να τεθεί με βιοψία ήπατος
 - Γ Συνοδεύεται από οζώδες ερύθημα
 - Δ Το A και Γ
 - E Όλα τα παραπάνω**
87. Ποιο από τα παρακάτω σημεία παρατηρείται στην οξεία χολοκυστίτιδα:
- A Kerning
 - B Murphy**
 - Γ Giordano
 - Δ Gordon
 - E Babinski
88. Η μακροσφαιριναιμία Waldenström χαρακτηρίζεται από
- A Διήθηση του μυελού από πλασματοκύτταρα >50%
 - B Μονοκλωνική IgM παραπρωτεΐνη**
 - Γ Χαρακτηριστικές λυτικές βλάβες των οστών
 - Δ Απουσία λεμφαδενικών διογκώσεων
 - E Όλα τα παραπάνω
89. Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό για το σύνδρομο Gilbert
- A Η συχνότητά του στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 1%
 - B Χαρακτηρίζεται συνήθως από πολύ μεγάλη αύξηση της ολικής χολερυθρίνης του ορού (>6 mg/dl)
 - Γ Οφείλεται σε διαταραχή απέκκρισης της συζευγμένης χολερυθρίνης
 - Δ Απαιτείται πάντοτε βιοψία ήπατος για επιβεβαίωση της διάγνωσης
 - E Αποτελεί αθώα κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού της χολερυθρίνης**

90. Ποια από τις ακόλουθες καταστάσεις δεν αποτελεί αιτία πυλαίας υπέρτασης:
- A Αιθυλική αλκοόλη
 - B Σύνδρομο Budd-Chiari
 - Γ Ηπατίτιδα Α**
 - Δ Ηπατίτιδα Β
 - E Ηπατίτιδα C
91. Στους μείζονες παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο υπάγονται τα εξής, εκτός από ένα:
- A Κάπνισμα
 - B Μυοκαρδίτιδα**
 - Γ Χαμηλή HDL(<40mg%)
 - Δ Υπέρταση
 - E Σακχαρώδης διαβήτης
92. Η πιο σοβαρή επιπλοκή του οικογενούς μεσογειακού πυρετού είναι:
- A Η οξεία κρίση κοιλιακού άλγους
 - B Η οξεία κρίση πλευριτικού άλγους
 - Γ Η οξεία αρθρίτιδα
 - Δ Η περικαρδίτιδα
 - E Η αμυλοείδωση**
93. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τις σουλφονουρίες
- A Είναι ευγλυκαιμικά φάρμακα και δεν προκαλούν υπογλυκαιμία
 - B Δρουν ελατώνοντας την αντίσταση στην ινσουλίνη
 - Γ Αντενδείκνυται η χορήγησή τους σε λεπτόσωμους ασθενείς
 - Δ Προκαλούν αύξηση του σωματικού βάρους**
 - E Έχουν νεφροτοξική δράση
94. Παρανεοπλασματική εκδήλωση καρκίνου του πνεύμονα είναι
- A Υπερασβεστιαμία
 - B Πυρετός
 - Γ Θρομβοφλεβίτιδα
 - Δ Θρομβοκυττάρωση
 - E Όλα τα παραπάνω**
95. Σε ασθενή με οξεία οσφυαλγία, ένδειξη λήψης ακτινογραφίας της οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης αποτελεί:
- A Η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδούς
 - B Ο πυρετός
 - Γ Ιστορικό καρκίνου
 - Δ Όλα τα παραπάνω**
 - E Το Β και Γ
96. Τι από τα παρακάτω δεν χαρακτηρίζει την θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα;
- A Πυρετός
 - B Νεφρική δυσλειτουργία
 - Γ Αναιμία
 - Δ Θρομβοκυττάρωση**
 - E Νευρολογικές διαταραχές

97. Ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV) >100 fl μπορεί να υπάρχει σε όλα τα παρακάτω, εκτός από:

- A Κατάχρηση αλκοόλ
- B Χρόνια ηπατοπάθεια
- Γ Υποθυρεοειδισμό
- Δ Σιδηροπενική αναιμία**
- E Δικτυοερυθροκυττάρωση

98. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λανθασμένο σχετικά με τη Λιστερίωση

- A Μεταδίδεται με μολυσμένα τρόφιμα
- B Παρατηρείται κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
- Γ Συνήθως εκδηλώνεται ως σήψη ή ως μηνιγγίτιδα
- Δ Αντιμετωπίζεται με χορήγηση κεφαλοσπορίνης**
- E Η διάγνωση τίθεται με καλλιέργεια αίματος ή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

99. Η φυσιολογική ωσμωτική πίεση του πλάσματος είναι:

- A 280-295 mOsm/kg**
- B 400-430 mOsm/kg
- Γ 10-20 mOsm/kg
- Δ 40-50 mmHg
- E 100-120 mmHg

100. Τι ισχύει για την κοκκιωμάτωση Wegener

- A Τα pANCA είναι ειδικά της νόσου
- B Τα cANCA ανευρίσκονται στο 50% των περιπτώσεων
- Γ Αντενδείκνυται η χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης
- Δ Προσβάλλει το κατώτερο, αλλά όχι το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα
- E Χαρακτηρίζεται από ταχέως εξελισσόμενη νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα**